

2.3.8. Vaccinazione antimeningococco

La vaccinazione routinaria contro meningococco C e B dovrà essere affiancata dall'identificazione e l'immunizzazione dei soggetti a rischio di infezione invasiva meningococcica perchè affetti dalle seguenti patologie o condizioni di vita:

- a) talassemia e anemia falciforme
- b) asplenia post-traumatica
- c) altre cause di asplenia
- d) condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi)
- e) diabete mellito tipo 1
- f) malattie polmonari croniche
- g) insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min
- h) alcoolismo cronico
- i) infezione da HIV
- j) immunodeficienze congenite
- k) malattie epatiche croniche gravi
- l) perdita di liquido cerebrospinale
- m) difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9)
- n) difetti dei toll like receptors di tipo 4
- o) difetti della properdina
- p) altre patologie con difetto dell'immunità innata
- q) trapiantati o candidati al trapianto
- r) riceventi fattori della coagulazione concentrati
- s) situazione epidemiologica ad alto rischio su valutazione dell' ISP della ASL.

Recenti riscontri epidemiologici che dimostrano infezioni da sierotipi di meningococco diversi dal C e dal B anche nel nostro Paese (esempio da Y e W 135) rendono opportuno l'utilizzo nei soggetti a rischio del vaccino coniugato tetravalente ACW135Y.

Nei casi di cui alla lettera c), i), m) è necessario somministrare 2 dosi a distanza di 8 settimane una dall'altra. Si sottolinea che gli studi di efficacia di questo vaccino, riportati in scheda tecnica, riguardano persone fino a 55 anni di età.

La somministrazione del vaccino meningococcico coniugato quadrivalente al di fuori dell'età indicata nella scheda tecnica si configura come off label e pertanto deve essere motivata, condivisa con l'utente e registrata.

In caso di splenectomia, il vaccino deve essere comunque somministrato anche se era stato già somministrato con il calendario routinario dell'infanzia.

23

Sono esclusi dall'offerta gratuita i viaggiatori internazionali per i quali la vaccinazione non è a carico del SSN ma resa disponibile in co-pagamento secondo il tariffario regionale.