Modified Early Warning Score

Nuova influenza A (H1N1)

Scoring previsto per l'invio ospedaliero di pazienti adulti con diagnosi presunta di influenzs A(H1N1) in corso di pandemia: ⩾ 3
Si raccomanda di tener conto di età e comorbidità

Cognome ..... Nome ..... Data di nascita ..... Luogo di nascita ..... Età .....

	3	2	1	0	1	2	3	Valore
Frequenza Respiratoria		< 8		9 - 14	15 - 20	21 - 29	> 30	.....
Frequenza Cardiaca		< 40	41 - 50	51 - 100	101 - 110	111 - 129	> 129	.....
Pressione Arteriosa Sistolica	< 70	71 - 80	81 - 99	101 - 199		> 200		.....
Livello di Coscienza	Non risponde	Risponde al dolore	Risponde alla voce	Vigile				.....
Temperatura corporea (°C)		< 35		35,1 - 38,4		> 38,5		.....

Comorbidità

Totale .....

Morgan RJM, Williams F, Wright MM. An early warning scoring system for detrcting developing critical illness. Clin Intensive Care 1997; 8: 100.
Carberry M. Implementing the modified early warning system: our experiences. Nurs Crit Care 2002; 7: 220-6.
Impaginazione a cura del Centro GRC - Regione Toscana

REGIONE TOSCANA GRC Gestione Rischio Clinico SICUREZZA DEL PAZIENTE