



Toscana: il punto della situazione sull'influenza stagionale e A/H1N1v

Aggiornamento al 31 gennaio 2010

Numero 4

In breve

Influnet - Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI)

I nuovi casi stimati delle sindromi influenzali in Toscana nella 4a settimana del 2010 (dal 25 al 31 gennaio 2010) sono stati 6.081, per un totale dall'inizio della sorveglianza Influnet di circa 208.000.

Nella quarta settimana del 2010 si osserva un lieve aumento del numero dei nuovi casi segnalati dai medici sentinella, in particolare aumentano i casi nelle fasce pediatriche.

Pronto soccorso (PS)

Gli accessi ai PS per sindrome influenzale e per sindrome respiratoria acuta sono in leggero aumento.

Ospedalizzazione dei casi gravi

Nessun caso grave di influenza A/H1N1v è stato ricoverato nella quarta settimana.

Dalla 48a settimana del 2009 alla 4a del 2010 i casi gravi di influenza A/H1N1v ricoverati sono stati 72. I casi gravi per i quali è stato necessario il ricovero in terapia intensiva sono 8.

Decessi per la nuova influenza A/H1N1v

Nessun decesso per influenza A/H1N1v si è verificato in Toscana nella quarta settimana.

Dall'inizio della pandemia nella regione si sono verificati 6 decessi dovuti all'influenza da virus A/H1N1: si tratta prevalentemente di soggetti di età superiore a 60 anni e con patologie croniche. La percentuale di vittime tra i malati è dello 0,003%.

Copertura vaccinale

In Toscana sono state somministrate 52.425 dosi di vaccino (l'8,4% delle dosi distribuite). Il tasso di copertura vaccinale complessivo è in linea con quello nazionale.

Documento a cura di:

Veronica Casotto¹, Cristina Epifani²

¹Settore Epidemiologia dei Servizi Sociali Integrati Osservatorio di Epidemiologia Agenzia Regionale di Sanità della Toscana; ²UO Epidemiologia ASL di Prato – Consulente Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Hanno collaborato alla realizzazione del documento:

Emanuela Balocchini, Lucia Pecori e Maria Laura Duratorre (Settore Igiene Pubblica - Regione Toscana); Marina Cappugi (Settore Assistenza Sanitaria - Regione Toscana); Serenella Acciai (Settore Operazioni Regione Toscana); Francesco Cipriani, Fabio Voller ed Elena Marchini (Osservatorio di Epidemiologia Agenzia Regionale di Sanità della Toscana); Carlo Di Pietrantonj e Annalisa Finesso (Servizio di Riferimento Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive - SeREMI e Servizio Sovranazionale di Epidemiologia – SSEpi).

I sistemi di sorveglianza per la nuova influenza da virus A/H1N1

La sorveglianza in Toscana è iniziata il 29 aprile 2009 con la segnalazione del primo caso di nuova influenza da virus A/H1N1. Le modalità di segnalazione dei casi, definite a livello centrale dal Ministero della Salute, hanno subito alcune modifiche nel corso del periodo di osservazione.

Dal **29 aprile al 26 luglio** sono stati segnalati alla Regione Toscana i casi di influenza A/H1N1v sospetti e confermati attraverso la compilazione di un'apposita scheda individuale (circolare ministeriale 20/05/2009 prot. 23277; vedi Allegato 1).

Dal **27 luglio al 19 ottobre** (circolari ministeriali n. 34102 del 27/07/2009 e n. 36208 del 07/08/2009) ciascuna azienda sanitaria ha raccolto le informazioni sui casi di nuova influenza da virus A/H1N1v attraverso una scheda individuale (Allegato2), trasmettendo settimanalmente le segnalazioni aggregate (Allegato 3) alla Regione.

Dal **19 ottobre al 22 novembre**, in concomitanza con l'avvio della sorveglianza dell'influenza stagionale da parte dei medici sentinella (sorveglianza Influnet), la segnalazione settimanale viene sospesa mentre procede la segnalazione dei soli casi confermati attraverso la compilazione della scheda individuale (circolari ministeriali n. 46387 del 13/10/2009 e n. 46540 del 14/10/2009).

Dal **23 novembre** viene ripristinata la segnalazione aggregata settimanale dei soli casi gravi ospedalizzati e dei decessi (circolare ministeriale n. 52279 del 19/11/2009 con modifica circolare ministeriale n. 53508 del 26/11/2009; vedi Allegati 4-5)


La sorveglianza Influnet

Il sistema di sorveglianza INFLUNET, attivo da 10 anni, si basa su una rete di medici di medicina generale (MMG) e di pediatri di libera scelta (PLS) che segnalano settimanalmente i casi di sindrome influenzale (Influenza Like Illness - ILI) osservati tra i propri assistiti al Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI). In Toscana sino alla stagione 2008/2009 i medici sentinella erano 42 (36 MMG e 6 PLS). Poiché il Piano pandemico regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2008, prevede un aumento dei medici sentinella nel periodo pandemico, con l'avvio della stagione 2009/2010 il numero di medici è salito a 57 (48 MMG e 9 PLS). Il periodo "obbligatorio" per la sorveglianza della sindrome influenzale è dalla 42^a settimana dell'anno in corso sino alla 17^a dell'anno successivo. Tuttavia, in linea con il piano pandemico nazionale, nella fase di allerta pandemica si è reso opportuno potenziare la sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, estendendo il periodo di osservazione oltre la 17^a settimana del 2009, per cui la sorveglianza è proseguita ininterrottamente fino all'inizio della nuova stagione epidemica (42^a settimana).

Sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali: il sistema di sorveglianza Influnet

Durante la 4^a settimana del 2010, 48 dei 57 medici sentinella toscani hanno comunicato 103 nuovi casi tra i propri assistiti, registrando un tasso d'incidenza pari a 1,6 ogni 1.000, con un lieve incremento rispetto alla settimana precedente (1,1 per 1.000 - Figura 1). L'incidenza totale in Italia nello stesso periodo è stata di 1,8 per 1000 assistiti. Dall'inizio della sorveglianza Influnet in Toscana (dal 12 ottobre 2009) al 31 gennaio 2010 il numero totale dei casi di sindrome influenzale (Influenza Like Illness - ILI) segnalati è di 3.790.

Figura 1. Incidenza della sindrome influenzale in Toscana nel periodo dal 12 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 – Fonte Influnet – CIRI



Applicando l'incidenza ottenuta dal sistema di sorveglianza Influnet alla popolazione toscana¹ e italiana² è possibile fornire una stima del numero di casi di ILI verificatisi in Regione e in Italia nelle diverse settimane di sorveglianza (Tabella 1). In totale nella Regione Toscana dall'inizio della sorveglianza Influnet si stima che si siano verificati circa 208.000 casi di sindrome influenzale.


¹ Popolazione al 01/01/2009

² Popolazione italiana: 60 milioni di abitanti

Tabella 1. Casi stimati in Toscana e in Italia per settimana

Settimana	Casi stimati in Toscana	Casi stimati in Italia
42 ^a (12/10/09-18/10/09)	7.304	
43 ^a (19/10/09-25/10/09)	20.578	270.000
44 ^a (26/10/09-1/11/09)	34.594	557.000
45 ^a (02/11/09-8/11/09)	41.083	756.000
46 ^a (09/11/09-15/11/09)	28.179	774.000
47 ^a (16/11/09-22/11/09)	20.022	661.000
48 ^a (23/11/09-29/11/09)	10.419	401.000
49 ^a (30/11/09-06/12/09)	8.417	222.000
50 ^a (07/11/09-13/12/09)	5.599	130.000
51 ^a (14/11/09-20/11/09)	4.783	106.000
52 ^a (21/12/09-27/12/09)	4.079	72.000
53 ^a (28/12/09-3/01/10)	4.264	73.000
1 ^a (04/01/10-10/01/10)	3.559	78.000
2 ^a (11/01/10-17/01/10)	4.709	83.000
3 ^a (18/01/10-24/01/10)	4.190	97.000
4 ^a (25/01/10-31/01/10)	6.081	111.000
Totale	207.860	4.391.000


Anche in questa settimana continua l'andamento stabile della curva epidemica, osservato a partire dalla 51^a settimana del 2009. Dall'inizio della sorveglianza Influnet si è osservato un incremento della frequenza di ILI che ha raggiunto il picco di massima incidenza nella prima settimana di novembre in Toscana (45^a settimana: incidenza 11,1 per 1.000) e nella seconda settimana di novembre in Italia (46^a settimana: incidenza 12,9 per 1.000). Successivamente si è verificata una riduzione della frequenza della malattia fino a raggiungere valori d'incidenza simili a quelli attuali alla fine del 2009 (51^a settimana :1,2 per 1000 assistiti). Nel confronto con i dati nazionali i tassi d'incidenza toscani sono maggiori soltanto nelle prime settimane della rilevazione, mentre successivamente sono in linea con i valori medi nazionali (Figura 2).

Figura 2. Incidenza totale (per 1.000) delle sindromi influenzali in Toscana e in Italia (dal 12 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010) – Fonte Influnet - CIRI

Rispetto alla settimana precedente si osserva un modesto aumento dell'incidenza nelle fasce di età pediatrica (tra 0-4 anni si sono verificati 4,9 casi ogni 1.000 bambini, tra 5-14 anni 3,4 casi ogni 1.000 ragazzi) mentre l'andamento è rimasto pressoché stabile tra i giovani adulti (15-64 anni: 1,4 casi ogni 1.000) e negli anziani (1 caso ogni 1.000 ultrasessantatrenni - Figura 3).


Dall'inizio dell'epidemia in Toscana, come in Italia, l'età infantile è stata quella maggiormente colpita, in accordo con quanto già osservato nelle ultime stagioni influenzali, anche se in quest'ultima il picco di massima incidenza rilevato nei bambini di 5-14 anni è molto più elevato (37,97 per 1.000 a fronte di un valore di 18,04 della stagione 2008/09, 17,5 della stagione 2007/08 e 17,4 per 1.000 nella stagione 2006/07).

Figura 3. Regione Toscana: incidenza totale e per fasce di età delle sindromi influenzali nel periodo dal 12 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 – Fonte Influnet – CIRI



Il confronto dell'andamento dell'ILI nelle ultime stagioni influenzali in Toscana evidenzia un inizio anticipato della sindrome influenzale per la stagione 2009/10 che già nella prima settimana di novembre ha raggiunto la massima frequenza (Figura 4). Nelle precedenti stagioni influenzali, invece, il picco epidemico veniva in genere raggiunto nelle prime settimane dell'anno successivo. L'incidenza delle sindromi influenzali nell'attuale stagione epidemica (2009/10) è superiore a quella delle stagioni precedenti, ad eccezione della stagione 2000/05 dove si è osservato il livello maggiore di incidenza.

Figura 4. Incidenza delle sindromi influenzali in Toscana, dalla stagione 2004/05 alla stagione 2009/10 – Fonte Influnet - CIRI




Accessi al pronto soccorso

È stata attivata a livello nazionale una rete sentinella di strutture di pronto soccorso dotate di sistemi informatizzati di rilevazione degli accessi in grado di inviare i dati in tempo reale all'autorità sanitaria competente territoriale e regionale. In Toscana sono stati individuati 5³ strutture di pronto soccorso sentinella. Ogni settimana i dati raccolti vengono confrontati con la linea di base calcolata dal modello statistico di regressione ciclica⁴ che permette di valutare l'andamento e l'eventuale superamento delle soglie di allerta.

Considerando gli accessi per sindromi respiratorie acute (ARI) si osserva un andamento degli accessi in linea con l'atteso⁵ per tutto l'anno 2009 fino alla 41^a settimana, quando inizia un incremento rapido del numero dei soggetti che si rivolgono ai PS per tale causa, con un picco notevolmente superiore all'atteso nella 44^a settimana. Successivamente si rileva una brusca caduta degli accessi fino a valori inferiori all'atteso dopo la 47^a settimana per poi riprendere nella 52^a settimana (Figura 5).

Figura 5. Numero di accessi per sindrome respiratoria (codici ICDIX-CM 462, 466.0, 666.1, 480-487, 786.0, 786.2, 786.5, 793.1, 780.6) ai pronto soccorso "sentinella". Regione Toscana – periodo dal primo gennaio 2009 al 30 gennaio 2010 - Fonte Elaborazioni a cura del Ministero della Salute su dati della Regione Toscana




³ 5 PS dell'azienda sanitaria di Firenze

⁴ Elaborazioni a cura del Servizio di riferimento Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive - SeREMI, Servizio Sovranazionale di Epidemiologia - SSEpi

⁵ calcolato sulla base delle precedenti stagioni influenzali

Nell'intero periodo preso in esame, un numero di accessi per ILI⁶ superiore all'atteso si è osservato soltanto nelle settimane 43^a, 44^a, 45^a e 46^a del 2009, mentre nelle successive i valori sono in linea con l'atteso e a volte anche inferiori (Figura 6).

Figura 6. Numero di accessi per ILI e numero di accessi attesi per ILI ai pronto soccorso "sentinella". Regione Toscana – periodo dal 12 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 – Fonte Elaborazione a cura del Ministero della Salute su dati della Regione Toscana



⁶ Il numero dei valori osservati può subire delle modifiche rispetto alle settimane precedenti, a causa del continuo aggiornamento dei dati

I ricoveri per ILI

Dal 23 novembre 2009 (48^a settimana) secondo la circolare ministeriale del 19 novembre 2009, le aziende sanitarie devono trasmettere settimanalmente alla Regione il dato aggregato sui nuovi casi gravi ospedalizzati con conferma di infezione da virus A/H1N1v per fasce d'età. Questo sistema di sorveglianza ha identificato sino al 31 gennaio 2010, 72 casi di nuova influenza A/H1N1v confermata ricoverati: per 8 di questi è stato necessario il ricovero in terapia intensiva (Tabella 2). Nella quarta settimana del 2010 non si sono registrati ricoveri per casi gravi di influenza A/H1N1v.

Tabella 2. Casi gravi di influenza A/H1N1v ospedalizzati nel periodo 23 novembre 2009 – 31 gennaio 2010 per fasce di età. Regione Toscana

Settimana	Descrizione	Fasce di età					Totale
		0-4	5-14	15-44	45-64	65+	
48 ^a	casi ospedalizzati	8	12	10	1	1	32
(23/11/09-29/11/09)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	0	1	1
49 ^a	casi ospedalizzati	4	1	9	5	0	19
(30/11/09-06/12/09)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	1	0	1
50 ^a	casi ospedalizzati	2	0	3	1	1	7
(07/11/09-13/12/09)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	0	0	0
51 ^a	casi ospedalizzati	2	0	0	1	0	3
(14/11/09-20/11/09)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	1	0	1
52 ^a	casi ospedalizzati	1	0	1	0	2	4
(21/12/09-27/12/09)	di cui in terapia intensiva	1	0	1	0	1	3
53 ^a	casi ospedalizzati	0	0	0	2	0	2
(28/12/09-3/01/10)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	0	0	0
1 ^a	casi ospedalizzati	0	0	1	0	0	1
(04/01/10-10/01/10)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	0	0	0
2 ^a	casi ospedalizzati	0	0	0	1	0	1
(11/01/10-17/01/10)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	1	0	1
3 ^a	casi ospedalizzati	0	0	1	2	0	3
(18/01/10-24/01/10)	di cui in terapia intensiva	0	0	1	0	0	1
4 ^a	casi ospedalizzati	0	0	0	0	0	0
(25/01/10-31/01/10)	di cui in terapia intensiva	0	0	0	0	0	0
Totale	casi ospedalizzati	17	13	25	13	4	72
	di cui in terapia intensiva	1	0	2	3	2	8

La sorveglianza dei decessi

Nella prima settimana del 2010 si è verificato in Toscana un decesso dovuto all'influenza AH1N1v. Dall'inizio della pandemia sono 6 i decessi in Toscana dovuti alla nuova influenza, prevalentemente in soggetti di età superiore a 60 anni.

In tutti i casi per i quali era disponibile la scheda di segnalazione dell'evento, 5 su 6, riportavano la presenza di una o più patologie croniche sottostanti.

In Toscana la percentuale di vittime in rapporto al totale stimato dei malati con sindrome influenzale è di 0,003% (in Italia 0,005%), inferiore rispetto ai valori osservati nelle stagioni influenzali precedenti (tra 0,1-0,5%).

Copertura vaccinale

In Toscana, come nel resto nelle altre regioni italiane, l'offerta della vaccinazione contro la nuova influenza è stata organizzata per categorie a rischio prioritario (Ordinanza ministeriale dell'11 settembre 2009 con successive ordinanze di modifica del 30 settembre e del 3 dicembre 2009). La campagna vaccinale ha coinvolto tutte le aziende sanitarie (ASL e Aziende Ospedaliero-Universitarie - AOU), i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta toscani. Al 31 gennaio 2010 nella Regione Toscana sono state somministrate 52.425 dosi di vaccino (845 nell'ultima settimana), 50.892 prime dosi e 1.533 seconde dosi. In Toscana è stato somministrato l'8,4% delle dosi distribuite dal Ministero della Salute contro il dato nazionale dell'8,8% (range: 3,6%-21,8%). Le coperture vaccinali per tutte le categorie previste dall'ordinanza ministeriale sono riportate in Tabella 3. La copertura vaccinale complessiva è in linea con il dato nazionale (Toscana 3,5% vs Italia 4,0%): coperture più elevate rispetto al dato nazionale si registrano nei bambini con meno di 24 mesi nati pretermine (25,4% in Toscana vs 10,3% nazionale) e nelle persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni (gruppo e), mentre nelle altre categorie mostra valori lievemente inferiori.

Tabella 3. Copertura vaccinale¹ (%) per categoria e area territoriale (aggiornamento al 31 gennaio 2010)

<i>Categoria (OM 30 settembre 2009)</i>	<i>AV Centro</i>	<i>AV Nord- Ovest</i>	<i>AV Sud- Est</i>	<i>AOU</i>	<i>Toscana</i>	<i>Italia</i>
a1 Personale sanitario e socio-sanitario	12,9	9,9	15,3	18,7	13,2	15,1
a2 Personale forze di pubblica sicurezza e protezione civile; personale corpo Vigili del fuoco Ministero Interno; personale forze armate; personale dei servizi pubblici essenziali.	4,7	3,5	8,5	0,0	5,4	5,9
a3 Donatori di sangue periodici	0,1	0,2	0,4		0,2	0,8
b1 Donne al 2°-3° trimestre di gravidanza	8,9	7,5	12,8		9,2	12,0
b2 Donne che hanno partorito da meno di sei mesi o persona che assiste il bambino	1,3	2,7	4,4		2,2	3,3
c Portatori di almeno una delle condizioni di rischio di età compresa tra 6 mesi e 65 anni.	17,2	8,7	14,1	88,3	12,1	12,4
d1 Bambini di età superiore a sei mesi che frequentano l'asilo nido*	1,5	5,5	0,1		2,6	5,2
d2 Soggetti con meno di 24 mesi nati gravemente pretermine	55,7	21,6	2,8		25,4	10,3
d3 Minori che vivono in comunità o istituzionalizzati *	6,8	7,3	0,0		6,8	7,5
e Persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni*	0,5	0,4	0,3		0,4	0,2
f Persone di età compresa tra 18 e 27 anni*	0,1	0,1	0,0		0,1	0,1
Totale	3,2	3,0	4,0	20,2	3,5	4,0

*non incluse nei precedenti punti

¹ per il calcolo della copertura vaccinale nelle singole categorie sono state considerate solo le aziende sanitarie che hanno fornito il dato della popolazione eleggibile

Bibliografia

Sistema di sorveglianza Influnet: www.influciri.it

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 20 maggio 2009
Sindrome influenzale da nuovo virus del tipo A/H1N1. Aggiornamento al 20 maggio 2009

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 27 luglio 2009
Aggiornamento delle indicazioni relative alla prevenzione sorveglianza e controllo della Nuova Influenza A da virus influenzale A(H1N1)v

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 07 agosto 2009
Note di esplicazione/integrazione alla nota circolare DGPREV/V/34102/1.4.c.a.9 del 27 luglio 2009 "Aggiornamento delle indicazioni relative alla prevenzione, sorveglianza e controllo della Nuova Influenza da virus influenzale A(H1N1)v"

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 30 settembre 2009
Misure urgenti in materia di protezione dal virus influenzale A(H1N1)

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 13 ottobre 2009
Sorveglianza della nuova Influenza AH1N1 e sorveglianza epidemiologica dell'Influenza - stagione 2009-2010 - Allineamento dei sistemi di sorveglianza

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 14 ottobre 2009
Sorveglianza della nuova Influenza AH1N1 e sorveglianza epidemiologica dell'influenza - stagione 2009-2010 - allineamento dei sistemi di sorveglianza

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 19 novembre 2009
Sorveglianza delle ospedalizzazioni, delle forme gravi e complicate e dei decessi della Nuova Influenza da virus influenzale A(H1N1)v e rilevazione della copertura vaccinale per il vaccino pandemico

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009
Sorveglianza delle ospedalizzazioni, delle forme gravi e complicate e dei decessi della Nuova Influenza da virus influenzale A(H1N1)v e rilevazione della copertura vaccinale per il vaccino pandemico Circolare 19 novembre 2009, precisazioni

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 03 dicembre 2009
Misure urgenti in materia di contenimento dell'impatto dell'influenza pandemica A (H1N1) sulle scorte di sangue ed emocomponenti per il fabbisogno trasfusionale nazionale, in attuazione della Direttiva 2009/135/CE della Commissione europea del 3 novembre 2009

Cnesps-Iss *Flunews* Aggiornamento epidemiologico settimanale numero 14
(www.epicentro.iss.it/focus/h1n1/pdf/flunews/FluNews_14.pdf)

Allegato 1

Scheda per la raccolta di informazioni su casi di nuova influenza da virus A/H1N1 secondo la circolare ministeriale n. 23277 del 20/05/2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio V Malattie Infettive

Scheda per la raccolta di informazioni su casi di nuova influenza da virus A/H1N1 - Nota Circolare del 20/5/ 2009 n. 23277

(da inviare, immediatamente, entro le 12 ore)

Regione: _____ Provincia: _____

Cognome: _____ Nome: _____ Sesso (M/F): _____

Data Nascita: __/__/____ Data Inizio Sintomi: __/__/____ Data Prima Visita: __/__/____

Medico Segnalatore e Suo Recapito: _____

Contatti con casi di influenza: Sì (specificare Paese/i _____) / No / Non noto

Situazione in cui si è verificato il contatto: Abitazione / Struttura sanitaria / Viaggio /

Collettività (specificare tipo _____) / Non noto

Se viaggio, indicare paese/i provenienza e volo/coincidenze: _____

Sintomi all'inizio della malattia:

Febbre >= 38° <input type="checkbox"/>	Starnuti <input type="checkbox"/>	Congiuntivite <input type="checkbox"/>	Mal di testa <input type="checkbox"/>
Mal di gola <input type="checkbox"/>	Tosse secca <input type="checkbox"/>	Diarrea <input type="checkbox"/>	Astenia <input type="checkbox"/>
Raffreddore <input type="checkbox"/>	Tosse produttiva (con catarro) <input type="checkbox"/>	Nausea <input type="checkbox"/>	Dolori muscolari <input type="checkbox"/>
Rinorrea <input type="checkbox"/>	Difficoltà respiratoria <input type="checkbox"/>	Vomito <input type="checkbox"/>	Dolori articolari <input type="checkbox"/>

Altro (specificare.....)

Gestione Paziente: accettazione con percorso dedicato: Sì / No

Ricovero:

Sì data: __/__/____ Ospedale, Reparto, tel.: _____ No

Isolamento: Sì / No

Campioni Clinici Prelevati per indagini di laboratorio:

Tamponi nasali e nasofaringei / Sangue per emocoltura e sierologia / Sputo-escreato
Lavaggio broncoalveolare

Indirizzo, Telefono e fax Laboratorio: _____

Diagnosi Laboratorio:

RT-PCR (pos neg) sieroconversione/aumento titolo anticorpale >= 4 volte

Isolamento virus in coltura

Profilassi con Antivirali: Oseltamivir Zanamivir Altro No Non noto

Trattamento con Antivirali: Oseltamivir Zanamivir Data Inizio: __/__/____ No

Complicanze: Nessuna / Polmonite / Encefalite / Otite / Altro / Non noto

Vaccino antinfluenzale stagione 2008-2009: Sì / No

Esito del Caso: Dimesso / Isolamento domiciliare / Trasferito /

Deceduto (data Decesso __/__/____)

Classificazione alla presentazione: Sospetto / Probabile

Classificazione Finale: Confermato / Escluso

Inviare a: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - DGPrev, Ufficio V Malattie Infettive;

fax 0659943096, email: malinf@sanita.it;

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, fax 0644232444

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio Nazionale di riferimento - Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, fax 0649387183

Allegato 2

Scheda per la raccolta di informazioni su casi di nuova influenza da virus A/N1N1 da parte del servizio competente. Ordinanza ministeriale n. 34102 del 27/07/2009

Allegato 1
(nota circ. 24.7.09)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio V Malattie Infettive

Scheda per la raccolta di informazioni su casi di nuova influenza da virus A/H1N1 da parte del servizio competente

REGIONE _____	ASL _____
Provincia: _____	

Informazioni sul paziente

Cognome: _____ **Nome:** _____ **Sesso (M/F):** _____

Data Nascita: ___/___/___ **Data Inizio Sintomi:** ___/___/___

Contatti con casi di influenza negli ultimi 7 giorni: Si / No / Non noto

Situazione in cui si è verificato il contatto: Abitazione / Struttura sanitaria / Viaggio spec. _____

Collettività (specificare tipo _____) Non noto

Sintomi all'inizio della malattia:

Febbre $\geq 38^{\circ}$ Starnuti Congiuntivite Mal di testa

Mal di gola Tosse secca Diarrea Astenia

Raffreddore Tosse produttiva (con catarro) Nausea Dolori muscolari

Rinorrea Difficoltà respiratoria Vomito Dolori articolari

Altro (specificare.....)

Ricovero: Si **data:** ___/___/___ **Ospedale, Reparto, tel.:** _____ No

Isolamento domiciliare: Si / No

Se prelevato campione, per indagini di laboratorio, specificare:

Tamponi nasali/nasofaringei / Sangue per emocoltura /sierologia / Sputo-escreato / Lavaggio broncoalveolare

Se profilassi, specificare: Oseltamivir Zanamivir Altro No Non noto

Se trattamento con Antivirali, specificare: Oseltamivir Zanamivir **Data Inizio:** ___/___/___ No

Complicanze: Nessuna / Polmonite / Encefalite / Otite / Altro _____ / Non noto

Vaccino antinfluenzale stagione 2008-2009: Si / No

Esito del Caso: Guarito Deceduto (data Decesso ___/___/___)

Se conferma di Laboratorio effettuata, specificare: Confermato / Escluso

Allegato 3

Scheda per la segnalazione settimanale di casi di influenza da virus A/H1N1 da parte del servizio competente

Allegato 2
(nota circ. 24.7.09)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio V Malattie Infettive

ASL⁽¹⁾ _____ / REGIONE⁽²⁾ _____

Scheda per la segnalazione settimanale di casi di influenza da virus A/H1N1 da parte del servizio competente

Periodo di riferimento (da lunedì a domenica): ____/____/____ - ____/____/____

	Totale casi 0-4 anni	Totale casi 5-14 anni	Totale casi 15-24 anni	Totale casi 25-34 anni	Totale casi 35-44 anni	Totale casi 45-54 anni	Totale casi 55-64 anni	Totale casi ≥65 anni	Età non nota
NUOVI casi clinici nel periodo di riferimento									
di cui casi con conferma di laboratorio									
di cui casi ospedalizzati									

	Totale casi 0-4 anni	Totale casi 5-14 anni	Totale casi 15-24 anni	Totale casi 25-34 anni	Totale casi 35-44 anni	Totale casi 45-54 anni	Totale casi 55-64 anni	Totale casi >65 anni	Età non nota
NUOVI decessi nel periodo di riferimento									

Comunicato il: ____/____/____ (possibilmente il martedì successivo al periodo di riferimento)

(1) Da inviare da parte della ASL:

all'Assessorato alla Sanità - Regione/PP.AA. _____

(2) Da inviare da parte dell'Assessorato alla Sanità:

al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - DGPrev, Ufficio V Malattie Infettive;
fax 0659943096, email: malinf@sanita.it;

e all'Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, fax 0644232444 oppure email outbreak@iss.it;

e all'Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio Nazionale di riferimento - Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, fax 0649387183

Allegato 4

Scheda per la segnalazione settimanale di casi ospedalizzati e dei decessi di influenza da virus A/H1N1

Allegato I
(nota alla circ. 25.11.09)

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio V Malattie Infettive

REGIONE _____

Scheda per la segnalazione settimanale (dal lunedì alla domenica) di casi ospedalizzati e dei decessi di influenza da virus A/H1N1
da parte del servizio territoriale competente _____

Periodo di riferimento (da lunedì a domenica): ____/____/____ - ____/____/____

	Totale casi 0-4 anni	Totale casi 5-14 anni	Totale casi 15-24 anni	Totale casi 25-34 anni	Totale casi 35-44 anni	Totale casi 45-54 anni	Totale casi 55-64 anni	Totale casi ≥ 65 anni	Età non nota
NUOVI casi ospedalizzati con infezione confermata da virus A/H1N1 nel periodo di riferimento									
- di cui in terapia intensiva/rianimazione									

	Totale casi 0-4 anni	Totale casi 5-14 anni	Totale casi 15-24 anni	Totale casi 25-34 anni	Totale casi 35-44 anni	Totale casi 45-54 anni	Totale casi 55-64 anni	Totale casi > 65 anni	Età non nota
NUOVI decessi con infezione confermata da virus A/H1N1 nel periodo di riferimento									

I dati aggregati da tutti i servizi della Regione saranno registrati settimanalmente on line da parte dell'Assessorato alla Sanità sul sito <https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx>

Comunicato il: ____/____/____ (nella mattinata del martedì successivo al periodo di riferimento)

Allegato 5

Scheda per la notifica delle forme gravi e complicate e dei decessi di influenza da virus A



Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della Salute

Allegato 2
(nota circ. 25.11.09)



Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Ufficio V - Malattie Infettive

SCHEDA PER LA NOTIFICA DELLE FORME GRAVI E COMPLICATE E DEI DECESSI DI INFLUENZA DA VIRUS A [COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE]

Dettagli di chi compila la scheda

Data segnalazione

Regione

ASL notifica

Dati compilatore

Nome

Cognome

telefono fisso

telefono cellulare

e-mail

Dettaglio anagrafica paziente

Iniziale NOME Iniziale COGNOME Sesso M F

Data di nascita se data nascita non disponibile, specificare età anni compiuti o età mesi

Comune di residenza

Se femmina <50 aa di età, è in stato di gravidanza? sì no non noto se sì, mese di gestazione

Informazioni cliniche

Data insorgenza primi sintomi

Ricovero ospedaliero: SI NO Se sì, data ricovero

Se sì, nome dell'Ospedale:

Reparto (specificare):
terapia intensiva//rianimazione(UTI) Intubato ECMO
DEA/EAS
Terapia sub intensiva
Cardiochirurgia
Malattie Infettive
Altro (specificare)

Terapia Antivirale (Oseltamivir-Tamiflu/Zanamivir-Relenza): SI NO

Se sì, data inizio terapia durata (giorni)

Presenza di patologie croniche? si no non noto

se sì quali?

Tumore	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Diabete	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Malattie cardiovascolari	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Deficit immunitari	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Malattie respiratorie	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Malattie renali	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Malattie metaboliche	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Obesità BMI tra 30 e 40	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
Obesità BMI>40	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto
altro	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	non noto

se altro, specificare: _____

Data del prelievo per conferma A(H1N1)v:

Confermato per A(H1N1)v: sì no

Se sì, data di conferma A(H1N1)v:

Invio del campione al Laboratorio del Centro Nazionale Influenza presso ISS: sì no

Se presenza complicanze, specificare:

Data complicanza

Eseguita radiografia sì no non noto

Polmonite:

Polmonite influenzale primaria	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Non noto	<input type="checkbox"/>
Polmonite batterica secondaria	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Non noto	<input type="checkbox"/>
Polmonite mista	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Non noto	<input type="checkbox"/>

Grave insufficienza respiratoria acuta (SARI)

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (vedi definizione allegata)

Altro: _____

Follow-up

Esito: Guarigione Data
 Decesso Data

Se decesso, certificato di morte: sì no

Se sì, specificare:

- causa iniziale: _____
- causa intermedia: _____
- causa terminale: _____
- altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso: _____

Definizione di ARDS: con il termine di ARDS si indica una forma di grave insufficienza respiratoria acuta, esito di una reazione del polmone verso cause di varia natura, che si manifesta come una sindrome infiammatoria polmonare, caratterizzata da lesioni alveolari diffuse ed aumento della permeabilità dei capillari polmonari, con incremento dell'acqua polmonare extracapillare, definito come edema polmonare non cardiaco. Clinicamente l'ARDS è caratterizzata da una dispnea grave, tachipnea e cianosi, nonostante la somministrazione di ossigeno, riduzione della "compliance" polmonare ed infiltrati polmonari bilaterali diffusi a tutti i segmenti. Secondo l' *American European Consensus Conference* la diagnosi di ARDS può essere posta qualora siano presenti i seguenti criteri:

- insorgenza acuta della malattia;
- indice di ossigenazione PaO₂/FiO₂ inferiore a 200 mmHg, indipendentemente dal valore PEEP (Positive End Expiratory Pressure);
- infiltrati bilaterali alla radiografia toracica in proiezione antero-posteriore;
- pressione di chiusura dei capillari polmonari (PCWP) inferiore a 18 mmHg, escludendo un'origine cardiaca dell'edema polmonare.