

1 - IL CALENDARIO VACCINALE UNIVERSALE

Le vaccinazioni previste nel calendario regionale universale come offerta attiva e gratuita, sono schematizzate, con i relativi intervalli, nella tabella 1

Tabella 1 – Calendario vaccinale regionale universale (aggiornamento aprile 2015)

Vaccino	Nascita	3° mese	3° mese	4° mese	5° - 6° mese	6° mese	13° mese	13° mese	14°-15° mese	5-6 anni	11-18 anni	11-20 anni	19-64 anni	65 anni	>65 anni
DTPa		DTPa			DTPa		DTPa			DTPa ¹	dTpa ²				
IPV		IPV			IPV		IPV			IPV					
Epatite B **	HBV ³	HBV			HBV		HBV								
Hib **		Hib			Hib		Hib								
MPRV - MPR *									MPRV ⁴	MPRV ⁴	MPR / MPR+Var ⁵				
PCV **		PCV			PCV				PCV						PCV ¹²
Men C **							Men C ⁶					Men ACWY ⁷			
Men B			Men B ¹¹	Men B ¹¹		Men B ¹¹		Men B ¹¹							
Varicella *												Var ⁸			
HPV **											HPV ⁹				
Influenza **															Influ ¹⁰

Legenda:

DTPa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare
 dTpa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti
 IPV: vaccino antipolio inattivato
 HBV: vaccino anti epatite B
 Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b
 MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
 MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella
 PCV: vaccino antipneumococcico coniugato
 Men C: vaccino antimeningococcico C coniugato
 Men ACWY: vaccino antimeningococcico quadrivalente coniugato ACWY
 Men B: vaccino antimeningococcico B
 HPV: vaccino antipapilloma virus
 Var: vaccino antivaricella
 Inlu: vaccino antinfluenzale

Interpretazione delle indicazioni di offerta per età:

3° mese: dal 61° giorno di vita
 4° mese: dal 91° giorno di vita
 6° mese: dal 151° giorno di vita
 13° mese: dai dodici mesi compiuti (12 mesi+1 giorno)
 5-6 anni: dai 5 anni compiuti ai 7 non compiuti
 11-18 anni: dagli undici anni compiuti ai 18 non compiuti
 11-20 anni: dagli undici anni compiuti al compimento del 20° anno di età

Note: Per gli ulteriori dettagli vedere i capitoli specifici dedicati

- * Le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, varicella sono offerte gratuitamente a tutti i soggetti anamnesticamente negativi ed ai soggetti a rischio riportati nel capitolo dedicato
- ** le vaccinazioni contro Epatite B, Hib, Pneumococco, Meningococco, HPV, Influenza, oltre alle classi di età indicate nel presente calendario, sono offerte gratuitamente a tutti i soggetti a rischio riportati nel capitolo dedicato.

- 1) Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formulazione con vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare di tipo adolescenziale-adulto (dTpa).
- 2) Un richiamo si somministra all'età di 11-18 anni (preferibilmente a 14 anni). I Successivi richiami verranno eseguiti ogni 10 anni. Per i soggetti mai vaccinati in precedenza contro il tetano o con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione, questo deve essere eseguito somministrando due dosi di dT seguite da una terza di dTpa.
- 3) Ai bambini nati da madri positive per HBsAg, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche anti epatite B; il ciclo va completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il tredicesimo mese mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni. (vedi capitolo dedicato per le specifiche)
- 4) La vaccinazione MPRV consta di due dosi di cui la prima al 14-15° mese e la seconda a 5-6 anni
- 5) Per i soggetti suscettibili per una o più delle malattie previste nel vaccino, 2 dosi a distanza di almeno 1 mese l'una dall'altra. Utilizzare MPRV fino a 12 anni (non compiuti) e MPR+Varicella nelle età successive.
- 6) Dose singola. Se richiesta nel primo anno di vita (condizioni particolari di rischio) è prevista la somministrazione di 2-3 dosi in base all'età di inizio. Tra il secondo ed il sesto anno di vita è inoltre previsto il recupero dei bambini mai vaccinati, somministrando una singola dose.
- 7) Nella fascia di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni preferenzialmente all'età di 12 anni, è opportuna la verifica ed il recupero degli adolescenti non vaccinati nell'infanzia (dose singola vaccino quadrivalente coniugato ACWY). Agli adolescenti già vaccinati nell'infanzia, sarà offerta gratuitamente ed attivamente 1 dose (booster) con vaccino quadrivalente coniugato ACWY. La vaccinazione è offerta gratuitamente fino al compimento del 20° anno.
- 8) Soggetti anamnesticamente negativi. Somministrare due dosi a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra.
- 9) Solo per il sesso femminile. L'offerta gratuita si intende dagli undici anni compiuti ai 18 non compiuti secondo le modalità di offerta attiva o a richiesta indicate nella DGR n. 678/2012.
- 10) 1 dose annuale.
- 11) La vaccinazione contro il meningococco B consta di 4 dosi: la prima si somministra a metà del terzo mese di vita (76° giorno di vita, 15 giorni dopo esavalente+pneumo), la seconda a metà del quarto mese di vita (106° giorno di vita, 1 mese dopo la prima dose di Men B), la terza all'inizio del sesto mese di vita (151° giorno di vita, 1 mese dopo la seconda dose di esavalente+pneumo), la quarta al tredicesimo mese di vita (15 giorni dalla terza dose di esavalente +Men C)
- 12) La vaccinazione antipneumococcica nell'età adulta, con vaccino coniugato 13 valente, è introdotta a partire dalla coorte dei sessantacinquenni (nel 2015 nati nel 1950)