

Tabella 2 Strategie di prevenzione per le donne in età fertile e strategia cocoon

Malattia	Test	Anamnesi	Età Fertile	Gestazione	Postpartum
Rosolia	Neg.	Anamnesi mai significativa per rosolia	vaccino MPR(1)	Controindicata	Vaccino MPR(1)
	Pos.		Soggetto immune per rosolia.		
Morbillo	NN	Anamnesi positiva per morbillo	Soggetto immune per morbillo		
	NN	Anamnesi positiva per vaccino 2 dosi	Soggetto immune per morbillo		
	NN	Anamnesi positiva per vaccino 1 dose	1 dose MPR	controindicata	1 dose vaccino MPR
	NN	Anamnesi negativa per morbillo e vaccino	Vaccino MPR(1)	Controindicata	Vaccino MPR(1)
Parotite	NN	Anamnesi negativa per vaccino	Vaccino MPR(1)	Controindicata	Vaccino MPR(1)
Varicella	NN	Negativa per malattia e vaccino	Vaccino V (2)	Controindicata	Vaccino V(2)
		Negativa per malattia e positiva per vaccino 1 dose	Vaccino V 1 dose	controindicata	Vaccino V 1 dose
		Positiva per malattia o vaccino 2 dosi	Soggetto immune per varicella.		
Difterite tetano pertosse	NN	Negativa per vaccinazione	3 dosi: 2 dT + 1 dTpa (3) (4)		
		Ultima dose > 10 anni	1 dose booster con dTpa ogni 10 anni (4)		
Influenza	NP	Gestazione in periodo epidemico	1 dose dal 2°-3° trimestre di gravidanza		

Legenda

NN : Non Necessario

NP : Non Pertinente

Note

1) Due dosi di vaccino trivalente contro gli agenti infettivi di morbillo, parotite e rosolia (MPR) a distanza di almeno 1 mese una dall'altra; utilizzabile anche in caso di anamnesi negativa per una delle patologie indicate

2) Due dosi di vaccino monovalente contro l'agente infettivo della varicella (V) a distanza di almeno 1 mese una dall'altra;

3) Due dosi di vaccino bivalente contro dT a distanza di almeno 1 mese una dall'altra, seguite da una terza dose dopo 6-12 mesi dalla seconda con vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse acellulare in formulazione per adulti dTpa

4) La vaccinazione con dTpa deve essere estesa al nucleo familiare (strategia cocoon) con l'obiettivo di proteggere il bambino contro la pertosse nei primi mesi di vita.