

Malattia	Test	Anamnesi	Età Fertile	Gestazione	Postpartum
Rosolia	Neg.	Anamnesi mai significativa per rosolia	vaccino MPR(1) o MPRV	Controindicata	Vaccino MPR(1) o MPRV
	Pos.		Soggetto immune per rosolia.		
Morbillo	NN	Anamnesi positiva per morbillo	Soggetto immune per morbillo		
	NN	Anamnesi positiva per vaccino 2 dosi	Soggetto immune per morbillo		
	NN	Anamnesi positiva per vaccino 1 dose	I dose MPR-MPRV	controindicata	1 dose vaccino MPR-MPRV
	NN	Anamnesi negativa per morbillo e vaccino	Vaccino MPR(1) MPRV	Controindicata	Vaccino MPR(1) MPRV
Parotite	NN	Anamnesi negativa per vaccino	Vaccino MPR(1) MPRV	Controindicata	Vaccino MPR(1)MPRV
Varicella	NN	Negativa per malattia e vaccino	Vaccino V (2) o MPRV	Controindicata	Vaccino V(2) MPRV
		Negativa per malattia e positiva per vaccino 1 dose	Vaccino V 1 dose o MPRV	controindicata	Vaccino V 1 dose O MPRV
		Positiva per malattia o vaccino 2 dosi	Soggetto immune per varicella.		
Difterite tetano pertosse	NN	Negativa per vaccinazione	3 dosi: 2 dT + 1 dTpa (3) (4) oppure 3 dTpa		
		Positiva per vaccinazione	1 dose booster con dTpa ogni 10 anni		
Influenza	NP		Raccomandata nel periodo epidemico se programmata procreazione medicalmente assistita		
HPV			<p>È inoltre opportuna la verifica dello stato vaccinale e il recupero con offerta della vaccinazione alle donne di 25 anni di età in occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), come indicato dal PNPV 2017-2019.</p> <p>La vaccinazione è offerta gratuitamente: alle donne che hanno subito un intervento per lesioni cervicali dovute ad infezioni da HPV ed alle donne HIV positive.</p>		

#### Legenda

NN : Non Necessario

NP : Non Pertinente

#### Note

1) Due dosi di vaccino trivalente contro gli agenti infettivi di morbillo, parotite e rosolia ( MPR ) a distanza di almeno 1 mese una dall'altra; utilizzabile anche in caso di anamnesi negativa per una sola delle patologie indicate o MRPV (o MPR+V) se suscettibile anche per la varicella.

2) Due dosi di vaccino monovalente contro l'agente infettivo della varicella ( V ) a distanza di almeno 1 mese una dall'altra; o MPRV (O MPR+V) in caso di anamnesi negativa per un' altra delle patologie indicate.

3) Due dosi di vaccino bivalente contro dT a distanza di almeno 1 mese una dall'altra, seguite da una terza dose dopo 6-12 mesi dalla seconda con vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse acellulare in formulazione per adulti dTpa .E' possibile comunque usare dTpa sia per i richiami sia per le vaccinazioni di base.