

PROCEDURE PER LA CONSEGNA, CONSERVAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO COMIRNATY-PFIZER

DISTRIBUZIONE E RITIRO DEL VACCINO

Prenotazione dei vaccini in farmacia

- Le prenotazioni dei vaccini possono essere effettuate presso tutte le farmacie convenzionate
- La prenotazione deve essere effettuata dal martedì al sabato della settimana precedente la consegna
- La chiusura delle prenotazioni è stabilita per il sabato alle ore 12.
- Nella fase iniziale è prevista la prenotazione di un massimo di 4 flaconi a settimana (24 dosi), successivamente eventuali maggiori disponibilità sono comunicate ai pediatri tramite SMS o per Mail
- Prima del ritiro della prima prenotazione richiedere in Farmacia:
 - a) Il Kit per il trasporto del vaccino (scatola di polistirolo + siberino)
 - b) Kit di Prova, utile per effettuare simulazioni per la diluizione e la preparazione di vaccino
 - c) Kit per la vaccinazione (siringhe da diluizione, siringhe da insulina, Aghi25/25, soluzione fisiologica, Adrenalina pronto uso)
 - d) Dispositivi di sicurezza: camici, guanti, mascherine

Distribuzione del vaccino alla farmacia

- Il lunedì le farmacie ospedaliere scongelano i flaconi prenotati dai pediatri.
- Il martedì alle ore 7.30-9.00 le confezioni preparate per i singoli pediatri sono consegnate ai corrieri
- Entro la giornata del martedì i flaconcini vengono consegnati alla farmacia

Ritiro dei vaccini prenotati in farmacia

- Se il Pediatra si è registrato nell'apposito sito della Regione lasciando i propri recapiti, l'avvenuta consegna dei vaccini in farmacia è notificata al pediatra con un sms
- Per ritirare i vaccini, anche alla prima prenotazione, recarsi in farmacia con il Kit di trasporto precedentemente ritirato: il box in polistirolo e il siberino ghiacciato da almeno 12 ore.
- Il box di polistirolo e i siberini devono essere conservati e utilizzati per i ritiri successivi
- I vaccini devono essere trasportati rapidamente in ambulatorio: Il kit di trasporto garantisce la temperatura controllata per 75 minuti
- I vaccini ritirati in farmacia vengono caricati automaticamente nel magazzino di SISPC del singolo pediatra
- Il vaccino può essere conservato a temperatura fra +2° e + 8 fino a 30 giorni dalla data di scongelamento che è riportata in ciascuna confezione.
- I flaconcini non diluiti vanno tenuti sempre in posizione verticale

DILUIZIONE DEL VACCINO

Estrarre il flacone dal frigo evitando di agitarlo	
Tenerlo 10 minuti a temperatura ambiente in posizione verticale	
Capovolgere delicatamente per 10 volte la fiala senza agitare	
Disinfettare il tappo di gomma del flaconcino (elastomero)	
Nella siringa per diluizione inserire l'ago fornito nel Kit, aspirare <u>1,8ml di soluzione fisiologica allo 0,9%</u> Tenere il flaconcino in verticale e inserire perpendicolarmente l'ago avendo cura di non toccare il contenuto del vaccino Inserire lentamente il liquido di diluizione	
Dopo aver inserito tutto il liquido di diluizione, lasciare lo stantuffo della siringa per aspirare 1,8 ml di aria e riequilibrare la pressione all'interno del liquido Si estrae l'ago e si disinfetta la superficie del tappino di gomma	
capovolgere delicatamente per 10 volte la fiala senza agitare	
Dopo la diluizione il flaconcino contiene 2,25 ml Può essere conservato a temperatura tra 2 e 30 °C per 6 ore	

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Si prende la siringa di insulina inserendo l'ago 25/25 fornito nel Kit	
pulire il tappo del flaconcino con un tampone disinfettante monouso.	
Tenendo verticale il flaconcino, inserire perpendicolarmente l'ago all'interno del liquido diluito e aspirare 0,3 ml di vaccino, facendo attenzione a non aspirare aria e a non avere bolle di aria nel liquido da iniettare Bolle di aria si possono formare più facilmente nell'aspirazione delle ultime dosi: le bolle di aria vanno eliminate pizzicando leggermente la siringa	
La dose di vaccino va iniettata <u>SENZA CAMBIARE L'AGO</u>	
Per prevenire eventuali contaminazioni microbiche non è consigliabile la preparazione di siringhe preriempite, ma aspirare la dose al momento dell'uso.	
Alla fine della giornata le dosi effettuate vanno registrate su SISPC	

DOSE DI RICHIAMO

In base alle recenti indicazioni la dose di richiamo può essere effettuata ai 21 giorni (il tempo massimo previsto per la seconda dose è di 42 giorni)